Finalité prévue
La poche pour stomisés est destinée à recueillir de manière passive les effluents d'une stomie. Le protecteur cutané adhésif a pour but de fixer la poche pour stomisés et d'adhérer à la peau intacte autour de la stomie.

Indications
Ce dispositif est indiqué pour les patients stomisés.

Avertissements
La réutilisation de ce produit à usage unique n'est pas recommandée, car une contamination croisée pourrait se produire.

Le retraitement, le nettoyage, la désinfection et/ou la (re)stérilisation peuvent compromettre les caractéristiques du produit et créer un risque supplémentaire de dommage corporel ou d'infection pour le patient.

Description du produit
Protecteur cutané à usage unique pour stomisés.

Les produits sont conçus pour être conservés dans leur boîte jusqu'à leur utilisation, car la boîte les protège et l'étiquette sur la boîte contient des informations importantes telles que le numéro de lot, la date de péremption et un code-barres unique.

Il n'est pas nécessaire de retirer ce dispositif avant une IRM, car il est compatible IRM.

Coloplast décline toute responsabilité pour les blessures et les préjudices qui résulteraient d'un emploi de ce produit d'une manière non conforme aux recommandations de Coloplast.

Conditions de stockage spéciales
Conservez le produit à l'horizontale.

Ne pas exposer à la lumière du jour.

Signalement des incidents
Si un incident grave venait à se produire pendant l'utilisation de ce dispositif ou comme conséquence de son utilisation, veuillez en informer le fabricant ainsi que votre autorité nationale.

Mode d'emploi

Préparation

1



Découper dans le support un ouverture de la taille et de la forme exactes de la stomie avec des petits ciseaux incurvés et le guide de coupe.On peut utiliser le guide de mesure de stomie joint pour mesurer la taille et la forme de la stomie. La forme de votre stomie peut changer, il est donc recommandé de la mesurer lorsqu'elle est la plus grande. C'est souvent lorsque vous vous asseyez.

Une adaptation parfaite entre l'ouverture et la stomie est importante pour réduire les risques de fuites et les problèmes de peau.

2



Nettoyer soigneusement la stomie et la peau environnante. La peau doit être parfaitement sèche avant l'application de l'adhésif.

Application

3

Rabattre les 5 pétales afin de préparer le protecteur cutané pour l'application.

4

Retirer le feuillet protecteur du protecteur cutané.

5

Maintenir le protecteur cutané en gardant les pétales repliés vers l'arrière.
Aligner la partie centrale du protecteur cutané autour de la stomie.

Presser soigneusement la partie centrale sur la peau.
Puis rabattre les pétales vers l'extérieur.

6

Presser fermement le protecteur cutané sur la peau en partant du centre vers l'extérieur.

7

Placez votre index dans l'anneau de couplage qui entoure la stomie. Appuyez soigneusement sur le protecteur cutané entre l'anneau de couplage et votre stomie pour vous assurer que la partie centrale du protecteur cutané forme un joint étanche avec la peau.

8

Exercer une pression à partir du centre du protecteur cutané et vers l'extérieur dans de multiples directions afin de garantir une adhérence fiable entre le protecteur cutané et la peau autour de la stomie.

9

Avant d'appliquer la poche, s'assurer que le protecteur cutané est propre. Vérifier que l'anneau de sécurité est ouvert.

Aligner le bas du couplage de la poche avec le bas du couplage du protecteur cutané.

Caractéristiques du produit



10

Relier la poche et le protecteur cutané à partir du bas, avec vos majeurs.

11

Glissez vos index vers le haut et exercez une légère pression sur le haut du couplage **jusqu'à ce que vous sentiez que la poche est solidement fixée** au protecteur cutané.

12

Fermer l'anneau de sécurité en pressant sur le verrou. La poche est solidement fixée au protecteur cutané lorsque vous entendez un clic.

Tirer délicatement sur la poche pour vérifier qu'elle est correctement fixée.

Retrait

1

Appuyez sur la petite languette turquoise face à votre estomac avec l'extrémité d'un doigt pour ouvrir l'anneau de sécurité.

2

Tenir la languette de retrait de la poche et retirer la poche en détachant soigneusement la poche du protecteur cutané.

3

Retirer délicatement le support en tirant sur la languette de retrait du support pour l'éloigner de l'estomac et rouler le support vers le bas.

Avec la main libre, appliquer une légère pression sur la peau pour faciliter le retrait.

Elimination

Le produit est destiné à un usage unique exclusivement et doit être éliminé conformément aux directives locales, par ex. avec les déchets ménagers normaux.

Ne pas jeter le produit dans les toilettes.

Plus d'informations sur la poche
Pour obtenir des renseignements complémentaires concernant l'utilisation de la poche, merci de consulter la notice d'utilisation se trouvant dans l'emballage des poches.

Notice d'utilisation également disponible en vidéo

Pour voir les instructions vidéo, pour pouvez scanner le code QR ou aller sur

www.coloplast.ch/concave-clickFR

Résoudre les problèmes récurrents

Le protecteur cutané n'adhère pas correctement à la peau

Veiller à suivre les instructions d'application de cette notice et s'assurer que la peau est complètement propre et sèche avant application. Il est important d'avoir un contact total entre le protecteur cutané et chaque pli de la peau. Exercer une pression sur le protecteur cutané pendant l'application pour garantir une adhérence suffisante.

La peau est rouge et/ou irritée sous le protecteur cutané

Une irritation de la peau peut avoir plusieurs origines. Cela peut être dû à une fuite causée par l'usage d'un appareillage inapproprié ou à un gabarit de découpe mal dimensionné. Mais cela peut également provenir d'un nettoyage insuffisant ou d'un retrait rapide de l'adhésif, ce qui peut endommager la peau. Si la peau est rouge, un dissolvant pour adhésif peut s'avérer utile. Abordez le problème avec votre infirmière stomathérapeute dès que possible.

Fuite sous le protecteur cutané

Une fuite peut avoir différentes origines. Elle peut être due à un changement de forme ou de taille du corps ou de la stomie, ou à une mauvaise application du protecteur cutané. Pensez à vous auto-évaluer en ligne à l'aide de BodyCheck sur www.bodycheck.coloplast.com pour voir si votre morphologie a changé. Si c'est le cas vous pourriez avoir besoin d'un appareillage différent, ou vous pourriez bénéficier d'un produit de soutien. Abordez le problème avec votre infirmière stomathérapeute dès que possible.

Explication des symboles

MD	Dispositif médical		Ne pas réutiliser
CE	Indique que le produit est conforme à la législation européenne concernant les dispositifs médicaux	UDI	Présente un code-barres qui contient le numéro d'identification unique du dispositif
REF	N° de référence	GTIN	(Global Trade Item Number) Code article international
	Date de péremption (AAAA-MM-JJ)		Conserver à l'abri du rayonnement solaire
LOT	Code de lot		Haut
	Date de fabrication (AAAA-MM-JJ)		Emballage recyclable
	Fabricant	MR	Compatible avec l'IRM
	Consulter le mode d'emploi		

CE Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebaek Denmark

Notice d'utilisation
23325260 Version 1
Le logo Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S. Tous droits réservés.© 2020-12-03

Coloplast

SenSura® Mio Concave

Plaque de protection pour stomie concave

Protecteur cutané
(2 pièces) à déclic



Notice d'utilisation